

# القرموط الإفريقي - المناطق شبه الصحراوية ALLER FUTURA EX, 1.3-1.5 MM

علف زريعة



## تحليل

|                     | 1.3 mm | 1.5 mm |
|---------------------|--------|--------|
| (%) بروتين خام      | 58     | 55     |
| (%) دهن خام         | 17     | 20     |
| NFE (%)             | 6,0    | 3,8    |
| (%) رماد            | 10,1   | 12,4   |
| (%) ألياف           | 0,9    | 0,8    |
| (%) فوسفور          | 1,2    | 1,8    |
| (م جول) طاقة كلية   | 21,6   | 21,7   |
| (م جول) طاقة مهضومة | 20,1   | 20,2   |

## تركيب

المواد الخام مرتبة أبجدياً . التركيب الكامل موضح على الكارت

بروتينات خلية واحدة, بروتينات نباتية, زيت سمك, فيتامينات ومعادن, مسحوق جمبرى, مسحوق سمك, مكونات وظيفية, منتجات الحبوب.

## مستويات التغذية الموصى بها

كجم علف لكل 100 كجم سمك يومياً

| (سمك) (جم) | MM  | درجة حرارة الماء |      |      |      |      |     |      |     |      |
|------------|-----|------------------|------|------|------|------|-----|------|-----|------|
|            |     | 14               | 16   | 18   | 20   | 22   | 24  | 26   | 28  | 30   |
| 4-10       | 1.5 | 0,77             | 1,28 | 2,04 | 3,07 | 3,83 | 4,6 | 5,11 | 4,6 | 4,09 |

## الأثر البيئي مع معدلات التحويل الغذائي المختلفة

الأشكال تكون لكل 100 كجم إنتاج سمكى

|                              | 1.3 mm |      |      | 1.5 mm |      |      |
|------------------------------|--------|------|------|--------|------|------|
| التحويل الغذائى              | 0,5    | 0,6  | 0,7  | 0,6    | 0,7  | 0,8  |
| (نيتروجين فى المخلفات) (كجم) | 0,28   | 0,33 | 0,39 | 0,32   | 0,37 | 0,42 |
| (نيتروجين فى الماء) (كجم)    | 1,61   | 2,48 | 3,36 | 2,21   | 3,04 | 3,87 |
| (فوسفور فى المخلفات) (كجم)   | 0,18   | 0,21 | 0,25 | 0,32   | 0,37 | 0,42 |
| (فوسفور فى الماء) (كجم)      | 0,01   | 0,07 | 0,15 | 0,31   | 0,43 | 0,56 |