



دنييس ALLER FUTURA EX, 1.3-1.5 MM

علف زريعة



تحليل

	1.3 mm	1.5 mm
(%) بروتين خام	58	55
(%) دهن خام	17	20
NFE (%)	6,0	3,8
(%) رماد	10,1	12,4
(%) ألياف	0,9	0,8
(%) فوسفور	1,2	1,8
(م جول طاقة كلية)	21,6	21,7
(م جول طاقة مهضومة)	20,1	20,2

تركيب

المواد الخام مرتبة أبجدياً . التركيب الكامل موضح على الكارت

بروتينات خلية واحدة, بروتينات نباتية, زيت سمك, فيتامينات ومعادن, مسحوق جمبرى, مسحوق سمك, مكونات وظيفية, منتجات الحبوب.

مستويات التغذية الموصى بها

كجم علف لكل 100 كجم سمك يومياً

(سمك (حجم	MM	درجة حرارة الماء								
		12	14	16	18	20	22	24	26	28
5-7	1.3	1,08	1,49	2,03	2,69	3,59	4,78	5,68	5,98	5,38
7-10	1.5	0,84	1,17	1,59	2,1	2,8	3,73	4,43	4,66	4,2

الأثر البيئى مع معدلات التحويل الغذائى المختلفة

الأشكال تكون لكل 100 كجم إنتاج سمكى

	1.3 mm			1.5 mm		
	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
التحويل الغذائى	0,6	0,7	0,8	0,7	0,8	0,9
(نيتروجين فى المخلفات (كجم	0,32	0,38	0,43	0,38	0,43	0,48
(نيتروجين فى الماء (كجم	2,3	3,15	3,99	3,15	3,99	4,83
(فوسفور فى المخلفات (كجم	0,25	0,29	0,34	0,29	0,34	0,38
(فوسفور فى الماء (كجم	0,16	0,26	0,35	0,26	0,35	0,45