

Rodaballo OCEAN NOVA EX, 1.3-1.5 MM



Pienso para alevines



DECLARACIÓN

| | 1.3 mm | 1.5 mm |
|-------------------------|--------|--------|
| Proteína bruta (%) | 53 | 53 |
| Grasa bruta (%) | 11 | 11 |
| NFE (%) | 19,0 | 19,0 |
| Cenizas (%) | 9,6 | 9,6 |
| Fibras (%) | 1,3 | 1,3 |
| P (%) | 1,3 | 1,3 |
| Energía bruta (MJ) | 20,5 | 20,3 |
| Energía digestible (MJ) | 17,5 | 17,5 |

COMPOSICIÓN

Consulte la etiqueta para la composición exacta.

aceite de pescado, harina de pescado, productos de grano, proteínas vegetales, vitaminas y minerales.

TABLA DE ALIMENTACIÓN INDICATIVA

Kg de pienso por 100 kg de peces por día

| Pez (gr) | MM | Temperatura del agua (°C) | | | | | | | | |
|----------|--------|---------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|------|
| | | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 1.5-3 | 1.3 mm | 1,85 | 2,19 | 2,6 | 3,11 | 3,81 | 4,5 | 5,48 | 5,77 | 5,19 |
| 3-6 | 1.5 mm | 1,42 | 1,69 | 2 | 2,4 | 2,93 | 3,46 | 4,21 | 4,44 | 3,99 |

IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN FUNCIÓN DE DIFERENTES ÍNDICES DE CONVERSIÓN

Los datos correspondientes a 100 kg de peces producidos

| | 1.3 mm | | | 1.5 mm | | |
|----------------------|--------|------|------|--------|------|------|
| Índice de conversión | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1 |
| N en las heces (kg) | 0,47 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,61 | 0,68 |
| N en el agua (kg) | 2,71 | 3,49 | 4,27 | 3,49 | 4,27 | 5,05 |
| P en las heces (kg) | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,31 | 0,35 | 0,39 |
| P en el agua (kg) | 0,21 | 0,3 | 0,39 | 0,3 | 0,39 | 0,48 |

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDO EN CO₂-EQV

Las cifras están en equivalentes de CO₂ (kg/kg de pienso)

| | 1.3 mm | 1.5 mm |
|--|-----------|-----------|
| CO ₂ -eq. con cambio de uso de tierra | 1,13-1,43 | 1,13-1,43 |
| CO ₂ -eq. sin cambio de uso de tierra | 1,01-1,25 | 1,01-1,25 |

22/07/2024